

Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel

Coenzyme compositum®

ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Acidum ascorbicum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Natrium riboflavinum phosphoricum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Thiaminum hydrochloricum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Pyridoxinum hydrochloricum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Nicotinamidum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Acidum cis-aconiticum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Acidum citricum Dil. D8 0,05 g, Acidum fumaricum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Acidum alpha-ketoglutaricum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Acidum DL-malicum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Acidum succinicum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Barium oxalsuccinicum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 8a) 0,05 g, Natrium pyruvicum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Cysteinum Dil. D6 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Pulsatilla pratensis Dil. D6 0,05 g, Hepar sulfuris Dil. D10 0,05 g, Sulfur Dil. D10 0,05 g, Adenosinum triphosphoricum Dil. D10 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Nadidum Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Coenzym A Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a) 0,05 g, Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva e radice Dil. D4 (HAB, Vorschrift 2a) 0,05 g, Natrium diethyloxalacetikum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 0,05 g, Manganum phosphoricum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 0,05 g, Magnesium oroticum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 0,05 g, Cerium oxalicum Dil. D8 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 0,05 g, Acidum thiocticum Dil. D6 aquos. (HAB, Vorschrift 8b) 0,05 g. Die Wirkstoffe 1 bis 21 werden über die letzten 2 Stufen gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00
Telefax: 07221 501-210
E-Mail: info@heel.de

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt. Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Coenzyme compositum ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

016481/5009 DE

-Heel vet

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, Coenzyme compositum ad us. vet. subkutan injizieren. Entsprechend der Tierart beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Pferd, Rind, Schwein: 5 ml

Ferkel: 2-3 ml

Schaf, Ziege: 2 ml

großer Hund: 3-4 ml

mittlerer Hund: 2 ml


kleiner Hund, Katze: 1-2 ml

Welpen: 0,5-1 ml.

Bei akuten Beschwerden kann die Dosis nach 24 Stunden wiederholt werden. Bei Rezidivneigung, chronischen Erkrankungen oder zur Langzeitbehandlung wird die Einzeldosis jeweils im Abstand von 4 Tagen verabreicht.

Dauer der Behandlung:

Hinweis: Das Präparat sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.



Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.

Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packungen nicht mehr nach diesem Datum! Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen. Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion.


5 und 50 Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 23129.00.00

Stand der Information:

September 2014



Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.